

日付	(   /   )	(   /   )	(   /   )	(   /   )	(   /   )	(   /   )
	治療 1 日目	治療 2 日目	治療 3 日目	治療 4 日目	治療 5 日目	治療 6・7 日目
治療	点滴を取りパルス療法を開始します。	パルス療法があります。	パルス療法を終了し問題がなければ点滴をはずします。状態によって点滴を続ける場合があります。医師の指示に従ってください。			
内服	パルス療法を行っている間はステロイド剤の内服はありません。			ステロイド剤の内服が始まります。		
処置	治療中は細めに血圧を測ります。治療薬開始前・開始後・30 分後・1 時間後・2 時間後・3 時間後・終了時。					
食事	病院食を食べて下さい。					
安静度	<input type="checkbox"/> 病室内 <input type="checkbox"/> 病棟内 <input type="checkbox"/> プレイルーム可 点滴治療中はベッド上安静です。トイレは歩いて可能です。			点滴治療は終了していますが走ったりしないように過ごしてください。		
排泄	おしっこの量またはオムツの重さを測って下さい。					
清潔	体拭きをします。		点滴をはずして問題なければシャワーが可能になります。点滴があれば体拭きです。			
その他	医師からパルス療法についての説明があります。付き添いをされる方は手続きをして下さい。 気分が悪くなったり頭痛・吐き気が出てくるなどあれば看護師にお知らせ下さい。 ご家族で、結核の既往のある方がいらっしゃる場合は医療者にお知らせ下さい。					