


禁煙外来を受ける

様へ 主治医()

ニコチネルTTS 保険診療用 兵庫医科大学病院 呼吸器内科

	1回目(/)	開始から約2週間 2回目(/)	開始から約4週間 3回目(/)	開始から約6週間 オプション内科診(/)	開始から約8週間 4回目(/)	開始から約12週間 5回目(/)
目標	禁煙の必要性と保険診療の流れが理解できる	禁煙開始後の問題点を把握し、対処できる	禁煙経過の振り返りができる			禁煙継続への自信を持つ事が出来る
診察前検査	①問診票の記入 ②体重測定 ③はく息の検査	①体重測定 ②はく息の検査 	①体重測定 ②はく息の検査	①体重測定 ②はく息の検査	①体重測定 ②はく息の検査	①体重測定 ②はく息の検査
診察指導内容	①保険診療と自由診療の選択 ②喫煙の害、禁煙の効果 ③ニコチン代替療法とスケジュール説明 ④禁煙を乗り超えるコツ 	①検査結果説明 ②禁煙開始後の問題点・離脱症状・副作用の確認	①検査結果説明 ②禁煙開始後の問題点・離脱症状・副作用の確認	①検査結果説明 ②禁煙開始後の問題点・離脱症状・副作用の確認	①検査結果説明 ②禁煙開始後の問題点・離脱症状・副作用の確認	①検査結果説明 ②禁煙開始後の問題点・離脱症状・副作用の確認 ③今後の生活指導 ④卒煙証書授与 
処方 	ニコチネルTTSが処方されます □ニコチネルTTS(30・20・10) ニコチン依存度によりニコチンガムも使用します	ニコチネルTTSが処方されます □ニコチネルTTS(30・20・10) ニコチン依存度によりニコチンガムも使用します	順調に行けば薬のサイズが小さくなります □ニコチネルTTS(30・20・10) ニコチン依存度によりニコチンガムも使用します	順調に行けば薬のサイズが小さくなります □ニコチネルTTS(30・20・10) ニコチン依存度によりニコチンガムも使用します	順調に行けば薬の処方はありません	順調に行けば薬の処方はありません
副作用	パッチを貼ったあとが赤い	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無
受診前のチェック項目	〃 水ぶくれ	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無
	〃 かゆい	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無
	頭痛	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無
	はきけ	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無
	眠りにくい	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無